

FRELON COMMUN

Vespa Crabro



- Taille : \approx 40 à 50 mm
- Ne vit pas la nuit, attiré par la lumière
- Couleur : orangé et jaune majoritairement
- Pique si l'on passe près du nid ou si agitation

— DESCRIPTION

Il ressemble à une guêpe en plus gros, rayé de jaune et de noir sur l'abdomen.

Sa tête, ses antennes et son thorax sont teintés de roux.



Les frelons se distinguent par la largeur plus importante de leur vertex (partie de la tête derrière les yeux) et par leur gastre arrondi (la section de l'abdomen juste derrière la « taille de guêpe »)

— HABITAT

Les nids sont souvent construits en hauteur (généralement peu accessibles), et moins gros que ceux du frelon asiatique.



— ORIGINE GÉOGRAPHIQUE

Europe, Asie du nord, Afrique du Sud et Amérique du Nord.

— PÉRIODE D'ACTIVITÉ et BIOLOGIE

De mars à décembre

Il a un cycle de vite annuel.

Les colonies meurent aux premiers froids sauf les jeunes femelles reproductrices.

Pendant les 6 premières semaines, la jeune reine nourrit les larves, les premières ouvrières l'aideront après. A son apogée, le nid a 5 000 alvéoles. Aux premiers froids, les mâles et les femelles reproductrices quittent le nid et se reproduisent.

